

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 08032002

**Вид:** Кукурудза цукрова

Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

**Назва сорту:** GX 5704 F1

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

05.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

| №  | Ознака  | Проявлення                    | Код |
|----|---|-------------------------------|-----|
| 1  | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 2  | Перший листок: форма верхівки   | загострена                    | 1   |
| 3  | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)                                | середній від 26 до 50         | 5   |
| 4  | Листок: положення листової пластинки і стеблом (листок над верхнім качаном)                               | ледь похиле                   | 3   |
| 5  | Стебло: степінь зигзагоподібності   | відсутня або дуже слабка      | 1   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 7  | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, до 50% рослин)                                | дуже ранній                   | 1   |
| 8  | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (на середній третині головної осі)                | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 9  | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно утворених пиляках)     | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)  | середнє                       | 5   |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілками (на нижній третині волоті)                              | малий від 6 до 25             | 3   |
| 13 | Волоть: положення бічних гілок (на нижній третині волоті)   | ледь відхилене                | 3   |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт  | невелика від 6 до 15          | 3   |
| 15 | Качан: час появи шовку (50% рослин)   | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку  | відсутнє                      | 1   |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення шовку  | відсутня або дуже слабка      | 1   |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)   | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 19 | Волоть: довжина головної осі (від найнижчої бічної гілочки до верхівки, см)                               | коротка від 21 до 30          | 3   |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)                       | коротка                       | 3   |
| 21 | Волоть: довжина бічних гілочок  | короткі                       | 3   |
| 22 | Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см                                 | ознака не визначається        | 0   |
| 23 | Лише для гібридів і сортів вільнозапилюваних: Рослина: довжина (врахов. волоть), см                       | довга                         | 7   |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослин                             | середнє до 0,6                | 5   |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (листок верхнього качана), см   | вузька до 8                   | 3   |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см  | середня від 10,1 до 20        | 5   |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см   | довга 15-18                   | 7   |
| 28 | Качан: діаметр (посередині), см   | великий від 4,1 до 5          | 7   |

Заявка №: 08032002

Вид: Кукурудза цукрова

*Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Назва сорту: ГХ 5704 F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

| №  | Ознака   | Проявлення          | Код |
|----|--|---------------------|-----|
| 29 | Качан: форма   | конусно-циліндрична | 2   |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт.                         | мала 8-14           | 3   |
| 31 | Качан: тип зерна (в центральній третині початку)             | цукрова кукурудза   | 6   |
| 32 | Качан: колір верхньої частини зерна                          | жовто-оранжевий     | 4   |
| 33 | Качан: колір нижньої частини зерна                           | жовто-оранжевий     | 4   |
| 34 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня                 | відсутнє            | 1   |
| 35 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | дуже слабка         | 1   |