

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 17122001 Назва сорту: Джолі **Заявник (код):** 1013 **Власник сорту (код):** 1013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190001

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	до довгого
6	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до довгої
7	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3	до еліптичної
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	слабке	3	до помірного
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	до помірної
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	до помірної
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5	
15	Листковий черешок: основне забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	до глибокого
17	Коренеплід: форма позовжнього розрізу	округла	3	до поперечно еліптичної
18	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
19	Коренеплід: за шириною	середній	5	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	велике	5	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	до загостреної
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5	до сильного
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	червоне	3	до пурпурового
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Маса товарного коренеплоду, г – 250. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання, дів – 110. Ураженість хворобами, %: церкоспорозом – 7; борошнистою росою – 7. Вміст сухої речовини в плоді, % – 14. Вміст загального цукру, % – 12.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.