

"шовку" - відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 85,5 ц/га, гарантований приріст складає - 7,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8,6 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78,8 %. Вміст крохмалю - 75,1 %, білка - 8,1 %.

06004083 П9571

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - сильна. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 83,8 ц/га, Лісостепу - 96,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 16,1 і 17,9 ц/га. Стійкість до засухи - 8,0 і 8,7 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 84,5 і 81,1 %. Вміст крохмалю - 72,7 - 74,2 %, білка - 10,3 - 8,1 %.

06004089 ПР38М27

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - коротка до середньої (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 96,7 ц/га, гарантований приріст складає - 18,4 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,4 %. Вміст крохмалю - 76,6 %, білка - 8,6 %.

® 05004107 ПР37Ф73

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 81,0 ц/га, гарантований приріст складає - 6,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,2 %. Вміст крохмалю - 75,0 %, білка - 8,0 %.

® 05004104 ПР39Б76

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - помірна. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусний, за довжиною - короткий (від 15 до 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-білий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 109,2 ц/га, гарантований приріст складає - 11,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 84,2 %. Вміст крохмалю - 71,5 %, білка - 9,3 %.

06004092 Прікслі

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 119,0 ц/га, гарантований приріст складає - 21,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 7,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81,8 %. Вміст крохмалю - 70,0 %, білка - 9,0 %.