

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, вторинних листочків, двома квітками на вузлі, має середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, коротке з середньою кількістю вузлів.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух", з восковим нальотом, довгий з середньою шириною та щільною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середні довжину і ширину, жовтого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглого насіння слабка.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Рослини висотою 80 - 111 см . Середньостиглий , вегетаційний період 80 - 90 днів . Маса 1000 насінин 229 - 271 г . Напівінтенсивного типу . За даними заявника рекомендується висівати за 100 -відсоткової господарської придатності 1,1 - 1,3 млн / га насінин . Урожайний . За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 31,5 - 35,8 ц / га , що на 7,2 - 10,6 ц / га більше стандартів . Посухостійкість вищесередня . Смакові якості добрі . Має підвищений вміст білка - 24,3 - 25,6 % . Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу . Кореневими гнилями уражується на рівні стандартів .

## 05001006 Маскара

Заявник: КВС Лохов ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослини сорту за висотою малі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, має середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та багатьма вузлами з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух", без воскового нальоту, довгий і широкий та малою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий і середньої ширини, зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглого насіння слабка.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини висотою 66 -81 см . Середньостиглий , вегетаційний період 84 - 92 дні . Маса 1000 насінин 243 - 260 г . Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 1,0 - 1,2 млн / га насінин . Високоврожайний . За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній

урожай 34,7 - 36,8 ц / га , що на 12,8 - 23,0 більше стандартів . У сприятливі роки здатний давати до 60 ц / га зерна . Посухостійкість вищесередня . Білка має 21,4 - 24,2 % . Стійкий до аскохітозу та антракнозу .

### 05001011 Улус

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", без воскового нальоту, середньої довжини і ширини та середньою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середні довжину та ширину, помірно зелене забарвлення, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину зі слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору без зморшкватості. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини висотою 71 - 84 см .Середньопізній , вегетаційний період 85 - 97 днів . Маса 1000 насінин 244 г . Сорт напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . За даними заявника рекомендується висівати за 100 відсоткової господарської придатності 1,2 - 1,4 млн / га насінин . Урожайний . За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 32,4 - 32,6 ц / га , що на 7,8 - 11,7 відсотки більше стандартів . Сорт стійкий проти вилягання та осипання . Посухостійкість середня . Білка має 22,2 - 22,5 % . Аскохітозом уражується нижче тандартів .

### 05001007 Чекбек

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середні за висотою, без антоціанового забарвлення, вторинних листочків, двома-трьома квітками на вузлі, має середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини з середньою кількістю вузлів.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух", без воскового нальоту, з середніми довжиною і шириною та малою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та округлу формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середні довжину і ширину, жовтого кольору з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та слабким ступенем його прояву.