

Вміст жиру в насінні становить 45,5%, білку – 18,6%, глюкозинолатів – 0,9%, ерукової кислоти – 0,3%. По якості належить до типу 00-нулевих сортів.

Внесений до Реєстру сортів рослин по зонах Лісостеп та Полісся на 2002 рік придатного для поширення.

Елвіс - заявник фірма Рустика /Франція/.

Рослини заввишки 160 см. Форма куща напівзімкнута. Стебло без антоціану і опушення. Стебловий листок ліроподібний без опушення. Облиственність 50%. Суцвіття – нещільна китиця. Квітки лимонно-жовті. Стручок сплющений, завдовжки – 6-13 см. Насінина кругла, чорна. Маса 1000 насінин 4-5г.

Вміст олії 46,5%, білку – 20,4%, ерукової кислоти – 0,3%, глюкозинолатів – 0,8%.

За роки випробування хворобами уражувався менше стандарта, шкідниками пошкоджувався на рівні стандарта (15-19%).

Вегетаційний період 285-290 днів.

Середня врожайність насіння за роки випробування (1999-2000рр) на сортодослідних станціях становила по зоні Лісостепу 27,8 ц/га, по зоні Полісся – 29,6 ц/га, по зоні Степу – 31,5 ц/га.

Найвищий врожай одержано 31,2 ц/га в 2000 році.

Занесений до Реєстру сортів рослин на 2001 рік по зонах Лісостепу, Полісся придатного до поширення.

РІПАК ЯРИЙ

Оксамит – заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 100-105 днів. Маса 1000 насінин 3,9-4,0 г. Стійкість до осипання засухи висока. За роки випробування одержано середній урожай насіння від 16,5 до 19,7 ц/га, що вище стандарта відповідно на 3,0-4,0 ц/га. Сорт по типу якості належить до 00-нулевих.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

Марія – заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 112-115 днів. Маса 1000насінин 4,0-4,2 г. Стійкість до засухи ,осипання на рівні 7-9 балів. Вміст олії в насінні 44,0%, білку 23,2 %. Середній урожай за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано від 17 до 19 ц/га, що вище стандарта на 3-4 ц/га. Сорт низькоеруковий та низькоглюкозинолатний /00/.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу