

ГІРЧИЦЯ БІЛА

Підпечерицька. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Рослини заввишки до 110 см. Кущ напівзімкнутий. Листки: нижні ліровиднорозсічені, верхні продовгувато-лінійні, покриті жорсткими волосками. Стебло опушене, діаметром 0,5-1,0мм. Суцвіття китицеподібне з жовтими квітками. Стручок горбкуватий, опушений, без антоціанового забарвлення.

Вегетаційний період до 100 днів. Середня урожайність за роки випробування 21,1 ц/га. Вміст жиру 25,4%, білка – 32,0%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками середнє (бактеріозом – 8,8%, ріпаковим квіткоїдом – 19%).

Рекомендовано для зони Лісостепу як олійний та кормовий.

Талісман. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 130 см. кущ нещільний. Листки зелені, опушені, черенкові, верхні листки злегка гофровані. Стебло опушене з антоціановим забарвленням. Стручок горбкуватий, мечевидний, опушений.

Вегетаційний період до 82 днів. Середній урожай за роки випробування 23 ц/га; вміст жиру 28,3%, білка – 30,1%.

Сорт стійкий до осипання, вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками нижче середнього (бактеріоз – 8,4%, ріпаковий квіткоїд – 10,9%).

Рекомендовано для зон Лісостепу і Полісся як олійний та кормовий.

РИЖІЙ ЯРИЙ

Гірський. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Рослини заввишки до 90 см. Кущ напівзімкнутий. Листки ланцетні, гладенькі, без опушення і антоціану. Стручок з гладенькою поверхнею, носик гострий. Насіння жовте, еліпсоїдне. Маса 1000 насінин – 1,2г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність за роки випробування від 10 до 18 ц/га. Вміст жиру – 34%, білка – 27%.

Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи. Ураження хворобами нижче середнього.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу.

Міраж. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 85 см. Кущ напівзімкнутий. Листки сидячі, лінійні, зеленого кольору; прикореневі – округло-овальні. Стебло злегка опушене, без антоціанового забарвлення.

Суцвіття – щиток з блідо-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння руде, продовгувате.

Вегетаційний період 66 днів. середня урожайність за роки випробування 10-16 ц/га. Вміст жиру 43,2%, білка – 27,1%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо-стійкий до осипання і посухи (4,2-4,1 бали). Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 57 см, довжина технічної частини стебла – 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабо гіллясте, не опушене, без антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуються на стеблі по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла.

Квітка п'ятигніздового типу, віночок світло-фіолетовий, пиляки сині. Плід – округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно коричневе. Маса 1000 насінин 7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га. Вміст жиру 45,4%, вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сорт стійкий до посухи, вилягання, осипання. Придатний до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

Айсберг. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Квітки п'ятірного типу, віночок білий, пелюстки віночка вузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття – нещільна звивина. Насіння темно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 4,4 г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність 16,5 ц/га. Вміст жиру 45,8%, йодне число 17,6.

Сорт відзначається стійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

Південна ніч. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуються по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла. Квітка велика, п'ятірного типу. Забарвлення пелюсток і пильників сине, рилець – фіолетове.