

Суцвіття – щиток з блідо-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння руде, продовгувате.

Вегетаційний період 66 днів. середня урожайність за роки випробування 10-16 ц/га. Вміст жиру 43,2%, білка – 27,1%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо-стійкий до осипання і посухи (4,2-4,1 бали). Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Лісостепу, Степу і Полісся.

## ЛЬОН КУДРЯШ

**Дебют.** Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 57 см, довжина технічної частини стебла – 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабо гіллясте, не опушене, без антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуються на стеблі по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла.

Квітка п'ятигніздового типу, віночок світло-фіолетовий, пиляки сині. Плід – округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно коричневе. Маса 1000 насінин 7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га. Вміст жиру 45,4%, вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сорт стійкий до посухи, вилягання, осипання. Придатний до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

**Айсберг.** Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Квітки п'ятірного типу, віночок білий, пелюстки віночка вузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття – нещільна звивина. Насіння темно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 4,4 г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність 16,5 ц/га. Вміст жиру 45,8%, йодне число 17,6.

Сорт відзначається стійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

**Південна ніч.** Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуються по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла. Квітка велика, п'ятірного типу. Забарвлення пелюсток і пильників сине, рилець – фіолетове.

Плід – округла п'ятигнізда коробочка. Насіння яйцеподібної форми з дещо звуженим і злегка зігнутим носиком, плоске, гладеньке, блискуче, слизьке, коричневе. Маса 1000 насінин 7,9г.

Вегетаційний період 84 дні. Середня урожайність 16,7 ц/га. Вміст жиру 44,8%, вихід олії з гектара 748 кг.

Сорт стійкий до осипання, посухи, вилягання.

Рекомендований для зони Степу.

## КУНЖУТ

**Надія.** Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, заввишки до 100 см, зелене, галузиться. Розміщення листків на стеблі почергове. Листки зелені, черешкові. Пластинки нижніх і верхніх листків суцільні; середніх – розсічені у вигляді трійчастого листа, злегка опушені. Стебло сильно обслистнене.

Квітка світло-фіолетова. Плід – коробочка з добре розвиненими несправжніми перегородками. Насіння світло-кремове. Середня вага насіння з однієї коробочки 0,25 г. Маса 1000 насінин 3,2 г., натура 609.

Вегетаційний період до 96 днів. Урожайність 10,7 ц/га. Вміст жиру 54,9%.

Сорт світлолюбивий, стійкий до перепадів температур повітря і весняних приморозків. Вибагливий до родючості ґрунту, не виносить важких ґрунтів. Стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання. Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендується для зон Степу та Лісостепу для отримання рослинної високоолеїнової олії.

## СУРІПИЦЯ ЯРА

**Горянка.** Заявник – Інститут хрестоцвітих культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, гіллясте, діаметром 0,5-0,7 см, без антоціанового забарвлення.

Кущ напівзімкнутий, середнє число гілок першого порядку 5, висота прикріплення нижніх гілок 15-20 см. Листки ліровидноперистонадрізані, не опушені, з слабким восковим нальотом, без антоціанового забарвлення.

Суцвіття – китиця з жовтими квітками. Насіння світло-коричнево-жовте, округле. В стручку до 20-30 насінин. Маса 1000 насінин 2,3 г.

Вегетаційний період 86 днів. Середня урожайність 12,3 ц/га. Вміст жиру 40%, ерукової кислоти 0,6%, глюкозинолатів 0,5%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до посухи та осипання.

Рекомендована норма висіву 5-6 кг/га; норма внесення добрив  $N_{90}P_{60}K_{120}$ .

Посів у першій декаді квітня.

Рекомендований для зони Полісся для виробництва рослинної олії.