

Вид: Люцерна мінлива *Medicago × varia* Martyn

Заявка № 15364001 Назва сорту: Одрі Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200080

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	висока	7
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 1	1
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	47,0	98,0	85,0
Довірчий інтервал, ц/га	15,7	25,6	23,5
Урожайність сухої речовини, ц/га	71	74,3	75,1
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	24	-23,7	-9,9
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	51	-24	-12
Тривалість періоду вегетації, дб	76	112	90
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	6
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	6	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти іржі, бал	7	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	9	8	8
Залистаність, %	40,8	35,5	29,0
Вміст сирого протеїну, %	20,4	23,6	21,2
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.