

Вид: Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

Заявка № 18121002 Назва сорту: Бенефайн **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191346

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: діаметр	середній	5
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	усічена	1
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	помірна	2
5	Листок: вигин верхньої частини	слабкий	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною	ознака не визначається	0
8	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною	середній	5
9	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма	ознака не визначається	0
10	Листок: забарвлення	світло-сірувато-зелене	9
11	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування	віялоподібне	3
13	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною	довгі	7
14	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю	ознака не визначається	0
15	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною	середня	5
16	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю	ознака не визначається	0
17	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість	ознака не визначається	0
18	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	мале	3
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	вузька	3
20	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи	відсутнє або дуже слабке	1
21	Стебло: за висотою	низьке	3
22	Стебло: фасціація	нявна	9
23	Стебло: положення бічних пагонів	напівпряме	3
24	Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків	ознака не визначалась	0
25	Квітка: забарвлення	блакитне	4
26	Час споживчої стиглості	ранній	3
27	Час стрілкування	дуже пізній	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 32. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 48. Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз – 7; церкоспороз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.