

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 17015006 Назва сорту: Вальс **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.03.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200223

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: плідність | диплоїд | 2 | |
| 2 | Зернівка: забарвлення алейронового шару | темне | 2 | |
| 3 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | сильна | 7 | |
| 4 | Колеоптиль: за довжиною | середній | 5 | |
| 5 | Прапорцевий листок: піхва за довжиною | коротка | 3 | |
| 6 | Прапорцевий листок: пластинка за довжиною | дуже коротка | 1 | |
| 7 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 | |
| 8 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | дуже сильний | 9 | |
| 9 | Час початку колосіння | середній | 5 | |
| 10 | Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною | коротка | 3 | |
| 11 | Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною | дуже вузька | 1 | |
| 12 | Колос: сизий наліт | помірний | 5 | |
| 13 | Соломина: опушення під колосом | дуже сильне | 9 | |
| 14 | Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками) | низька | 3 | |
| 15 | Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом | коротка | 3 | |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 5 | |
| 17 | Колос: за щільністю | нещільний | 3 | |
| 18 | Колос: положення в просторі | напівпохиле | 7 | |
| 19 | Зернівки: маса 1000 шт. | велика | 7 | |
| 20 | Зернівка: за довжиною | довга | 7 | |
| 21 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 | |
| 22 | Тип розвитку | озимий | 1 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | | 6,04 | 5,54 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | | 6,15 | 5,7 |
| +,- до усередненої урожайності, т/га | | 0,11 | 0,16 |
| +,- до усередненої урожайності, % | | 1,9 | 2,8 |
| Довірчий інтервал, т/га | | 0,24 | 0,15 |
| Тривалість періоду вегетації, дів | | 277 | 283 |
| Висота рослини, см | | 116,5 | 125 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | | 44,6 | 38,4 |
| Череззерниця, % | | 7,3 | 13,4 |
| Вміст білка, % | | 10,9 | 9,6 |
| Число падіння, с | | 169,1 | 163 |
| Стійкість до вилягання, бал | | 7 | 7 |
| Стійкість до обсіпання, бал | | 8 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | | 8 | 8 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | | 8 | 8 |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | | 8 | 8 |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | | 7 | 7 |
| Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал | | 9 | 8 |
| Стійкість проти снігової плісняви, бал | | 9 | 8 |
| Напрямок використання | | зерн | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.