

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 18045013 Назва сорту:** Акардія **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201140**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напіввпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,27	2,97	3,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	-0,1	0,73
+, - до усередненої урожайності, %	48,5	-3,1	29,6
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153	180,6	168,2
Висота рослини, см	70,3	68,2	82,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,4	10,4	12,9
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	35,5	38,3	34,7
Вміст олії, %	24	21,6	23,6
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**