

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка № 17109006 Назва сорту:** Карлано **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201103**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 80. Тривалість періоду до досягання, діб – 75. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 8, альтернативоз – 7, гниль біла – 7, гниль мокра бактеріальна – 8. Вміст сухої речовини, % – 13,1, загального цукру, % – 6,9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.