

**Вид:** Щавель кислий *Rumex acetosa* L.

**Заявка № 19131001 Назва сорту:** Старт **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 19.02.2021 **Патент № 210534**

**Дата пріоритету:** 12.09.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 03.03.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210505**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: положення листків розетки	напіврозлоге	3	
2	Розетковий листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Розетковий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
4	Розетковий листок: пластинка за шириною	середня	5	
5	Розетковий листок: форма пластинки (не враховуючи базальних часток)	помірно еліптична	2	
6	Розетковий листок: форма верхівки	тупа	2	
7	Розетковий листок: форма основи	стрілоподібна з лопатями, що розходяться	4	
8	Розетковий листок: черешок за довжиною	середній	5	
9	Рослина: кількість генеративних пагонів	середня	5	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Стебло: форма поперечного перерізу	округла	1	
12	Стебло: опушення	відсутнє	1	
13	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Стебловий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
16	Стебловий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
17	Стебловий листок: відношення довжина/ширина пластинки	середнє	5	
18	Стебловий листок: черешок за довжиною	середній	5	
19	Час повного цвітіння	середній	5	
20	Волоть: за довжиною	довга	7	
21	Волоть: забарвлення	зеленувато-рожеве	1	
22	Час досягання насіння	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 25,4. Тривалість періоду від сходів (відростання) до збирання врожаю, діб – 24. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *rumicis* Fuck.) – 7, пероноспороз (*Peronospora rumicis* Corda) – 9, бура плямистість (*Ramularia pratensis* Sacc.) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.