

Аріадна. Оригігатор - Вінницька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція.

Сорт створений методом гібридизації від схрещування сортів Маргарита і Білоцерківська 88. Сходи зелені, опушення рідке. Має 7-8 пар листочків, які зелені, краї листочків усічені, вусики в наявності. Залистяність 55-60%. Стебло зелене, опушення відсутнє, форма звичайна, висота рослин 97-113 см, має пряме закінчення. Квітки пазушні, дрібні, бузкового кольору, на квітконосі 2 квіточки. Боби луцильного типу, пергаментний шар розвинутий, тонкий. На рослині 25-50 бобів, у бобі по 7-8 до 9 насінин. Боби прямі, світло-коричневі, довжиною 6 см, шириною 0,8 см, опушення рідке. Насіння середнє, овальне, коричневе, рубчик - світлий, поверхність гладенька, матова. Маса 1000 насінин - 71,0г. Сорт має високу стійкість до розтріскування і опадання бобів та до посухи, незначну стійкість до вилягання. Вегетаційний період 95 днів. Вміст білка в сухій речовині - 18,1%, клітковини - 21,3%. Середня урожайність суміші - 81,0 ц/га, насіння - 17,8 -28,5 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Білоцерківська 10. Оригігатор - Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН.

Сорт виведений методом гібридизації сорту Білоцерківська 50 з селекційним номером 706/89.

Сходи слабо опушені; забарвлення стебельця, пазухи листка, черешка листочка, листової пластинки - зелене. Листок має 7-8 пар листочків видовжено-овальної форми які зеленого кольору, краї листочків цілюнокраї; кінчик листка виїмчастий, вусики розгалужені. Залистяність висока. Стебло зелене, опушене, звичайної форми, висотою 120-130 см, 22-28 міжвузля, на висоті 10 см 2-3 гілочки. Суцвіття - сидячі квітки, квітконос зелений, короткий, по 2-3 квіточки на кожному. Квітка середньої величини, парус і весельце лілового кольору, човник - пурпурового, чашечка опушена. Біб прямий з гострим зігнутиим кінчиком, світло-коричневого кольору, довжиною - 6,2 см, шириною - 0,8 см, опушення рідке, середня кількість насінин у бобі - 6 штук, максимальна - 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна - 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин - 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Знахідка. Оригігатор - Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства УААН.

Сорт виведений методом індивідуального відбору із зразків Молдавського науково-дослідного інституту польових культур.

Сходи не опушені; забарвлення стебельця, пазухи листка, черешка листочка, листової пластинки - зелене. Листок має 7-8 пар листочків видовжено-овальної форми які зеленого кольору, краї листочків цілюнокраї; кінчик листка виїмчастий, вусики двохлопастеві, видовжені. Залистяність висока - 55%. Стебло зелене без опушення, звичайної форми, висотою 100-130 см, 20-27 міжвузля, на висоті 10см 3-5 гілочки. Суцвіття - сидячі квітки, квітконос зелений із слабким фіолетовим відтінком, короткий, по 2 квіточки на кожному. Квітка середньої величини, парус червоно-фіолетовий, весельце фіолетового кольору, човник - зелений з фіолетовим відтінком, чашечка із 5-ти вузько-ланцетних чашолистків. Біб луцильний, прямий з гострим зігнутиим кінчиком, світло-коричневого кольору, довжиною - 6,2 см, шириною -

0,8 см, опушення рідке, середня кількість насінин у бобі – 6 штук, максимальна – 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна – 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин – 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Горошок (Вика озима)

Лебедина пісня. Оригіна́тор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: багаторазовий масовий добір із других укосів зразка двоукісної озимої (волохатої) вики, яка висівалася на несприятливих для зимівлі фонах з посліду́ючим перезапиленням кращих номерів.

Ознаки сорту: сходи зелені з рідким опушенням, має 6-8 пар листочків овально-продовгуватої форми, зелені, цілюккраї, у наявності два-три вусика, кінчик листка тупий. Ку́ць розгалужений. Стебло зелене, рідко опушене, висотою 139-161 см, міжвузлі більше 20. Суцвіття – багатоквіткова китиця. Кві́тконос довгий, зелений, 21-34 і більше квіточок на кві́тконосі. Квітки великі, синьо-фіолетового кольору. Боб щільний, пергаментний шар сильний, шов тонкий, темно-коричневого кольору, без опушення, продовгувато-ромбічної форми із загостреним кінцем. Середня кількість бобів на рослині до 150. У бобі 3-4 насінин, максимальна - 7-8.

Насіння середнє, округлої форми, чорне, темно-сіре, гладеньке, матове. Рубчик вузький, сірий, рідко світлий. Маса 1000 насінин – 35,4 г. Стійкий до несприятливих зовнішніх умов. Незначно уражається хворобами. Середньостиглий (вегетаційний період 300 днів). Вміст білка – 21,3%, клітковини – 24,9%. Середня урожайність сухої речовини – 78,0 ц/га, насіння – 20,2 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

Перлина. Оригіна́тор - Одеський державний аграрний університет.

Сорт відноситься до виду Панонська (*Vicia Pannonica* Crantz).

Форма рослин ку́щова. Стебло - 4-гранне, прямостояче, досить мі́цне. Висота рослин 90-110 см. Кві́тка –китиця (кисть) білого або кремового кольору. Пергаментний шар сильний. Кількість бобів на рослині в фазі повної стиглості від 17 до 30. Число насіння в бобі 5-6шт. Насіння округле, вугловате або трохи сплюснуте, крупне. Маса 1000 насінин 36-40 г.

Сорт дворачка, факультативний самозапильовач (до 40%), ранньостиглий, вегетаційний період (до укісної стиглості) – 219-227 діб.

Залистяність висока – 70-80%. Максимальний приріст надземної маси припадає на період від бутонізації до цвітіння. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсіпання бобів та насіння. Шкідниками пошкоджується менш ніж інші сорти вики. Твердокам'яних насінин біля 2-3%.

Дозрівання одночасне. Насіння збирають прямим комбайнуванням у звичайні роки за метеорологічними умовами.

Середня урожайність зеленої маси в суміші зі злаками сягає 600-700 ц/га з долею вики 60-70%, насіння – 9,5-13,0 ц/га.