

Сорт середньостиглий, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 74,9 ц/га, максимальна – 107,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 10,5%, клітковини – 31,3%.
Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та на зрошенні Степу.

Топаз. Оригіатор – Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий, високорослий, компактний, середньої щільності. Стебло – пряме, гладеньке, ніжне, не опушене, висотою – 140-155 см. Вузли темно-зеленого кольору. Кущистість середня. Залистяність 65-67%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які, трохи шороховаті. Язичок тупий, короткий, плівчастий, ледь надірваний із зубчастими краями, крайні зубці злегка закруглені (це і є відмінність сорту). Суцвіття – розкидиста волоть довжиною до 28 см, середньої щільності, бузково-зеленого кольору, без остюків. У колоску 6-8 квіточок. Насіння плоске, продовгувате, темно-фіолетового – сірого кольору.
Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 76-85 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,4 ц/га, максимальна – 96,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 13,4%, клітковини – 30,5%.
Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Скіф. Інститут тваринництва степових районів ім. М. Іванова „Асканія Нова” УААН, Інститут кормів УААН.

Сорт створений індивідуально-груповим добром із місцевої популяції.

Ознаки сорту: Кущ напіврозлогий, рихлий. Стебло – ніжне, без опушення, висотою 140 см, вузли – зелені, 4-10 міжвузля. Кущистість сильна. Залистяність 60,8%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які. Язичок тупий, короткий, рихлий. Суцвіття – продовгувата спрямована косо вгору волоть, довжиною 12-18 см, середньої щільності, безоста, темно-зеленого кольору. Насіння сіре, широко ланцетне.

Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 68-75 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,7 ц/га, максимальна – 86,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 14,6%, клітковини – 27,5%.
Сорт сінокісно-пасовищного напрямку використання, середньостиглий, дає три повноцінні укуси. Рекомендовано використовувати у зоні Степу.

Костриця лучна

Ліфара. Оригіатор - Дойче Заатфеределунг Ліпштатт- Бремен ГмбХ.

Ознаки сорту: Кущ напівпрямостоячий до середнього. Стебло - середнє до довгого. Листки зелені до темно-зеленого кольору. Час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок короткий до середнього, вузький до середнього. Найдовше стебло середньої величини. Суцвіття середньої довжини. Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу