

Сорт середньостиглий, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 74,9 ц/га, максимальна – 107,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 10,5%, клітковини – 31,3%.  
Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та на зрошенні Степу.

**Топаз.** Оригіатор – Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий, високорослий, компактний, середньої щільності. Стебло – пряме, гладеньке, ніжне, не опушене, висотою – 140-155 см. Вузли темно-зеленого кольору. Кущистість середня. Залистяність 65-67%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які, трохи шороховаті. Язичок тупий, короткий, плівчастий, ледь надірваний із зубчастими краями, крайні зубці злегка закруглені (це і є відмінність сорту). Суцвіття – розкидиста волоть довжиною до 28 см, середньої щільності, бузково-зеленого кольору, без остюків. У колоску 6-8 квіточок. Насіння плоске, продовгувате, темно-фіолетового – сірого кольору.  
Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 76-85 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,4 ц/га, максимальна – 96,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 13,4%, клітковини – 30,5%.  
Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

**Скіф.** Інститут тваринництва степових районів ім. М. Іванова „Асканія Нова” УААН, Інститут кормів УААН.

Сорт створений індивідуально-груповим добром із місцевої популяції.

Ознаки сорту: Кущ напіврозлогий, рихлий. Стебло – ніжне, без опушення, висотою 140 см, вузли – зелені, 4-10 міжвузля. Кущистість сильна. Залистяність 60,8%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які. Язичок тупий, короткий, рихлий. Суцвіття – продовгувата спрямована косо вгору волоть, довжиною 12-18 см, середньої щільності, безоста, темно-зеленого кольору. Насіння сіре, широко ланцетне.

Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 68-75 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,7 ц/га, максимальна – 86,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 14,6%, клітковини – 27,5%.  
Сорт сінокісно-пасовищного напрямку використання, середньостиглий, дає три повноцінні укуси. Рекомендовано використовувати у зоні Степу.

### Костриця лучна

**Ліфара.** Оригіатор - Дойче Заатфеределунг Ліпштадт- Бремен ГмбХ.

Ознаки сорту: Кущ напівпрямостоячий до середнього. Стебло - середнє до довгого. Листки зелені до темно-зеленого кольору. Час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок короткий до середнього, вузький до середнього. Найдовше стебло середньої величини. Суцвіття середньої довжини. Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу

кущистість. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування становила – 54,5 ц/га, максимальна – 82,5 ц/га, насіння – 3,8 ц/га. Вміст білка 10,8%, клітковини – 28,9%. Ранньостиглий, сінокісно-пасовищного типу. Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

### **Пажитниця багаторічна**

**Лета.** Оригігатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Сорт виведений методом індивідуального групового відбору ранньостиглих форм з екологічно віддалених популяцій. Ознаки сорту: Диплоїд. Габітус восени похилий. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву слабка. Час утворення суцвіття в рік посіву дуже пізній. Листки зелені. Габітус весною прямостоячий. Висота рослин весною - низька. Утворення суцвіття на другий рік – раннє. Прапорцевий листок середньої довжини, вузький. Довжина найменшого стебла включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані – середня. Довжина сформованого суцвіття - середня.

Сорт ранньостиглий, лукопасовищного напрямку використання. Середня урожайність сухої речовини – 67,6 ц/га, максимальна – 88,0 ц/га, насіння - 6,7 ц/га. За рік використання сорт дає 4-5 укосів. На одному місці сорт можна використовувати протягом 4-5 років. Зимостійкий, посухостійкий. Має середню стійкість до вилягання. Незначно уражується хворобами. Вміст білка 13,8%, клітковини – 26,5%. Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Андріана-80.** Оригігатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Диплоїд. Габітус восени напівпрямостоячий. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву слабка. Листки зеленого кольору. Рослина середньої висоти. Довжина прапорцевого листка середня, ширина – вузький. Довжина найдовшого стебла та верхнього міжвузля – середня. Суцвіття: довжина (коли вони повністю сформовані) – середнє; кількість волосків (коли вони повністю розкриті) – середня. Час утворення суцвіття на другий рік - середній.

Сорт має густе трав'яне покриття, придатний для газонів загального призначення, дуже декоративний. Середньостиглий, зимостійкий, стійкий до ураження хворобами. Залистяність -56,0%, висота рослин – 72 см. Середня урожайність сухої речовини -92,0 ц/га, насіння – 7,9 ц/га. Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.