

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 15088002 Назва сорту: Мадейра **Заявник (код):** 1046 **Власник сорту (код):** 1046

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.07.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180805

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	відсутня або дуже слабка	1
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	багато	7
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	ранній	3
37	Бульба: форма	видовжена	5
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	світло-бежеве	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		223,0	196,2
Довірчий інтервал, ц/га (±)		3,7	3,3
Урожайність, ц/га		238,6	161,7
+, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га		15,6	-34,5
+, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %		7	-18
Вміст крохмалю, %		16,4	15,0
Збір крохмалю, ц/га		39,1	24,2
Вміст сухої речовини, %		24,5	23,1
Тривалість періоду вегетації, діб		95	107
Середня маса товарної бульби, г		103	70
Дегустаційна оцінка, бал		7	9
Товарність бульб, %		51,0	80,5
Напрямок використання		стл	стл
Лежкість, бал		7	-
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспороїзу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Якість		скр	скр

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.