

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 260 -270 г. Середньостиглий , вегетаційний період 85 -97 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .
За даними заявника норма висіву 1,0 - 1 ,2 млн/ га схожих насінин .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 36,1 -37,6 ц/га , що на 15,9-20,9 відсотків більше стандартів . Білка має 21,9-23,4% .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Аскохітозом та коренивими гнилями уражується нижче стандартів .

® 03001006 Ескіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослини сорту мають середню висоту, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, середнього часу цвітіння та досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має середню кількість вузлів.

Листок помірно зелений з довгим черешком. Прилисток середньої величини, добре розвинений, без наявної формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, з середньою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка, з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика. Парус білого кольору, з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб довгий, вузький, жовтого кольору, має середню кількість насінних зачатків, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву. Форма зовнішньої частини верхівки бобу - загострена. Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглих насінин - помірна.

Насінина сферичної форми, з сім'ядолями жовтого кольору без зморшкватості та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 250 -270 г .Середньопізній , вегетаційний період 96 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .

За даними заявника норма висіву 1,1 -1,2 млн/ га схожих насінин .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,9 ц / га , що на 15,4 відсотки більше стандартів .Білка має 23,1 % .

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу . Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів .

® 04001007 Фаргус

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від двох до трьох, мають пізній час цвітіння та ранній час досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має багато вузлів.

Черешок листка середньої довжини . Прилисток добре розвинений, з наявною формою "кролячих вух" та восковим нальотом, має середню довжину