

® 06077002 Персея

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів. Дуже молоді пагони мають помірне антоціанове забарвлення. На пагоні наявні пурпурового кольору шипи, щільність яких у центральній третині помірна. На повністю розвинутих пагонах восковий наліт відсутній або дуже слабкий. Пагони в стані спокою середньої довжини, сіро-коричневого кольору. Рельєфність між жилками листка помірна. Листочків - іноді три, іноді п'ять. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка - темно-зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків короткий. Квітка середнього розміру. Квітконіжка із сильним антоціановим забарвленням. Плодоносні пагони середньої довжини. Плід темно-червоний, великий, довший, ніж ширший, твердий, помірно глянуватий. Схильність до утворення квітколожа - помірна. Період основного плодоношення - на пагонах минулого року, влітку. Час розпускання бруньок - середній. Час цвітіння - середній. Час досягання - ранній. Тривалість урожайного сезону - середня.

* Дані заявника.
* За даними заявника: середня врожайність - 175,7 ц/га, середня маса ягоди - 4,1 г, максимальна - 4,7 г. Ступінь підмерзання бруньок - 1 бал. Посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю й антракнозом - 1 бал. Пошкодження шкідниками: малиновим довгоносиком - 0,5 балів, попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 6,54%, вітаміну С - 28,07 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06077001 Саня

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

* Рослина утворює середню кількість молодих пагонів. Дуже молоді пагони із сильним антоціановим забарвленням. Молоді пагони вкриті пурпуровими шипами, щільність яких у центральній третині рідка. Восковий наліт на повністю розвинутих пагонах відсутній або дуже слабкий. Пагони в стані спокою довгі, сіро- та пурпурово-коричневі. Між жилками листка помірна рельєфність. Листочків іноді три, іноді п'ять. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка помірного зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків короткий. Квітка середнього розміру. Квітконіжка з помірним антоціановим забарвленням. Плодоносні пагони середньої довжини. Плід помірно-червоний, великий, довший, ніж ширший, середньо твердий, помірно глянуватий. Схильність до утворення квітколожа - помірна. Період основного плодоношення - на пагонах минулого року, влітку. Час розкриття бруньок - середній. Час цвітіння - середній. Час досягання - ранній. Тривалість урожайного сезону - коротка.

* Дані заявника.

* За даними заявника: середня врожайність - 196,1 ц/га, середня маса ягоди - 3,8 г, максимальна - 4,6 г. Ступінь підмерзання бруньок - 1 бал, посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю - 1 бал, антракнозом - 1,5 балів. Пошкодження шкідниками: малиновим довгоносиком - 0,5 балів, попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 5,28%, вітаміну С - 26,15 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.