

® 06083003 Оріана

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Кущ високий, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки помірне, восковий наліт - помірний. Молодий пагін з помірним антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку помірного зеленого кольору, помірно блискучий. Форма язичка листової пластинки - відкрита. Черешок листка з помірним антоціановим забарвленням, що розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки утворюється більше двох квіткових грон. Антоціанове забарвлення часток оцвітини слабке, зав'язі - відсутнє або дуже слабке. Ягода велика, округловидовжена, тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід велика. Час розвитку бруньок - середній. Час початку цвітіння - середній. Час досягання ягід - ранньо-середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 195,5 ц/га, середня маса ягоди - 2,2 г, максимальна - 3,5 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою - не уражується, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - 0,5 балів. Вміст загального цукру - 8,8%, вітаміну С - 216,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05083002 Пам'яті Леоніда Михайлевського

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Кущ середньої висоти, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки відсутнє або дуже слабке, восковий наліт - слабкий. Антоціанове забарвлення молодого пагона відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку листка помірна, блиск - слабкий. Форма язичка листової пластинки проста. Антоціанове забарвлення черешка листка відсутнє або дуже слабке. З однієї бруньки формується одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітини та зав'язі - відсутнє або дуже слабке. Ягода - дуже велика, округло-плеската, помірно тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - велика. Час розвитку бруньок - ранній. Початок цвітіння - дуже ранній. Час досягання ягід - дуже ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 140,0 ц/га, середня маса ягоди - 1,5 г, максимальна - 4,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 5-6 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою - 0,5 балів, антракнозом - не уражується. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - не уражується. Вміст загального цукру - 8,0%, вітаміну С - 220,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05083001 Університетська

Заявник: Національний аграрний університет