

® 06083003 Оріана

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Кущ високий, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки помірне, восковий наліт - помірний. Молодий пагін з помірним антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку помірного зеленого кольору, помірно блискучий. Форма язичка листової пластинки - відкрита. Черешок листка з помірним антоціановим забарвленням, що розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки утворюється більше двох квіткових грон. Антоціанове забарвлення часток оцвітини слабке, зав'язі - відсутнє або дуже слабке. Ягода велика, округловидовжена, тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід велика. Час розвитку бруньок - середній. Час початку цвітіння - середній. Час досягання ягід - ранньо-середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 195,5 ц/га, середня маса ягоди - 2,2 г, максимальна - 3,5 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою - не уражується, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - 0,5 балів. Вміст загального цукру - 8,8%, вітаміну С - 216,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05083002 Пам'яті Леоніда Михайлевського

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Кущ середньої висоти, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки відсутнє або дуже слабке, восковий наліт - слабкий. Антоціанове забарвлення молодого пагона відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку листка помірна, блиск - слабкий. Форма язичка листової пластинки проста. Антоціанове забарвлення черешка листка відсутнє або дуже слабке. З однієї бруньки формується одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітини та зав'язі - відсутнє або дуже слабке. Ягода - дуже велика, округло-плеската, помірно тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - велика. Час розвитку бруньок - ранній. Початок цвітіння - дуже ранній. Час досягання ягід - дуже ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 140,0 ц/га, середня маса ягоди - 1,5 г, максимальна - 4,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 5-6 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою - 0,5 балів, антракнозом - не уражується. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - не уражується. Вміст загального цукру - 8,0%, вітаміну С - 220,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05083001 Університетська

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Кущ середньої висоти, вузький, з великою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки помірне, восковий наліт - слабкий. Молодий пагін з помірним антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку темно-зеленого кольору, помірно блискучий. Форма язичка листкової пластинки проста. Антоціанове забарвлення черешка листка слабке, розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки формується одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітчини та зав'язі - слабке. Ягода велика, округловидовжена, тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - середня. Час розвитку бруньок - пізній. Початок цвітіння - пізній. Достигання ягід - пізніє.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 170,0 ц/га, середня маса ягоди - 1,2 г, максимальна - 3,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Хворобами - не уражується. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 8,4%, вітаміну С - 230,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

Суниця

® 05084008 Симфонія

Заявник: Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

Власник(и): Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

Підтримувач(і):

Заявник - Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд.

*Рослина кулясто-сплюснена, помірно щільна, помірної сили росту. Листок помірно блискучий, слабко пухирчастий, темно-зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з тупою основою, зубчастий - по краях. Волоски на черешку - сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка відсутнє або дуже слабке. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розміщене під листками. Квітка середнього розміру. Чашечка більша за віночок. Пелюстки віночка перекриваються одна з одною. Плід

дещо довший, ніж ширший, дуже великий, конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні - сильні. Плід рівномірного темно-червоного кольору, із сильним блиском. Зернятка розташовані врівень з поверхнею плоду. Чашечка дещо більша за діаметр плоду, розташована на рівні плоду, частки - відлеглі. М'якоть помірно тверда, темно-червона. Повітряна комірка - велика. Червоне забарвлення м'якоті розташоване на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - середньопізній. Час досягання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 195,0 ц/га, середня маса ягоди - 12,6 г, максимальна - 45,3 г. Зимо- та посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: суничного кліща та нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,6%, вітаміну С - 67,14 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 8-9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06084001 Веселка

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук