

Урожайність по зоні Степу 68,4 ц/га, Лісостепу - 84,5ц/га, гарантований приріст відповідно 18,2 і 19,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 8 балів, вилягання 8 і 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-81 %. Вміст крохмалю 72 - 77%, білка 9 - 7 %.

05004016 Фанжіо

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 72,3 ц/га, Лісостепу - 88,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 20,4 і 21,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю 74-75%, білка 10 - 8 %.

04004100 Футура

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 64,3 ц/га, Лісостепу - 93,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 12,4 і 26,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81 і 78 %. Вміст крохмалю 73-74%, білка 9 - 8 %.

04004101 Фабула

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже

пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 69,1 ц/га, гарантований приріст - 17,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

04004102 Фестиваль

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 66,8 ц/га, гарантований приріст - 15,1 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 8 %.

05004051 Флагман

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортівивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутня. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 78,2 ц/га, гарантований приріст - 11,4 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 75%, білка - 8 %.

04004081 Ханні

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):