

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий, пухирчастість слабка, зубці грубі, вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабо увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою - чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 30,5 ц/га, гарантована прибавка - 4,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,3 ц/га. Потенційна урожайність - 50,3 ц/га. Вміст жиру - 48,1-48,5%, білка - 17,0-17,8%, вихід олії - 1346-1440 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017079 ЕС Ізабелла**

**Заявник:** Євраліс Семанс

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження лише біля основи. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 31,5 ц/га, гарантована прибавка - 5,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,8 ц/га, гарантована прибавка - 8,6 ц/га. Потенційна урожайність - 51,3 ц/га. Вміст жиру - 49,5-50,9%, білка - 16,1-17,0%, вихід олії - 1544-1629 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

### **05017070 Ідальго**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Антоціанове забарвлення гіпокотилію відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно - зеленого кольору, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик плесканий, середнього розміру. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка велика, широко яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 32,7 ц/га, гарантована прибавка 5,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 34,3 ц/га, гарантована прибавка 7,8 ц/га. Потенційна урожайність 51,4 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 15,8-16,8%, вихід олії 1487-1554 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.