

## Ріпак озимий

### **04016006 Джеспер**

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - коротка. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,7, посухи - 8,7, осипання - 7,7 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюकोзинолатів - 0,8%. Вміст жиру - 44,9%, білку - 21,7%.

### **05016019 Декатлон**

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,7, посухи - 8,5, осипання - 7,3 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюकोзинолатів - 0,8%. Вміст жиру - 43,8%, білку - 21,8%.

### **05016018 Нельсон**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,7 ц/га, Полісся - 37,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,8 і 1,4 ц/га. Стійкість до вилягання - 9,0, посухи - 8,5, осипання - 7,4 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюकोзинолатів - 0,8%. Вміст жиру в межах 45,0-47,2%, білку - 20,9-21,2%.

### **04016005 Опус**

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Власник(и):

**Підтримувач(и):**

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - широка, середньої довжини. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Час цвітіння - ранній. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність у зоні Лісостепу - 34,2 ц/га, гарантована прибавка - 2,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,9, посухи - 8,5, осипання - 7,8 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,08%, глюкозинолатів - 0,6%. Вміст жиру - 45,1%, білку - 22,1%.

**05016005 ПР46В31**

**Заявник:** Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

**Власник(и):****Підтримувач(и):**

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність у зоні Лісостепу - 38,6 ц/га, гарантована прибавка - 6,7 ц/га. Стійкість до вилягання - 9,0, посухи - 8,6, осипання - 7,1 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,7%. Вміст жиру - 45,4%, білку - 21,8%.

**05016016 Токата**

**Заявник:** Сінгента Сідз С.А.С.

**Власник(и):****Підтримувач(и):**

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу - 35,3 ц/га, Полісся - 37,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,4 і 1,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 9,0; посухи - 8,3; осипання - 7,5 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1-0,2%, глюкозинолатів - 0,7-0,8%. Вміст жиру - 45,3-47,6%, білку - 21,0-21,6%.