

довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 230 ц/га. Маса 1000 насінин - 185 г. Вегетаційний період - 85 діб. Вихід чистого зерна - 39 %. Вміст сухої речовини - 28,5 %.

### **06032006 Люміна F1**

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 240 ц/га, урожай ранньої продукції - 240 ц/га. Маса 1000 насінин 225 г. Вегетаційний період - 83 доби. Вміст сухої речовини в зерні - 27 %.

### **06032003 Мегатон F1**

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листовою пластинкою і стеблом - великий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 270 ц/га. Маса 1000 насінин - 170 г. Вихід чистих качанів - 170 %. Вихід чистого зерна - 33 %.

Діб до досягання - 86. Вміст сухої речовини - 28 %.

### **07004019 Насолода**

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірно, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірно. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слабке. Волоть нещільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині