

**Підтримувач(и):**

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт відсутній. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка тонка, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 90,0 т/га, маса товарної цибулини 115-250 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 7,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,4. Вміст загального цукру, % - 8,2.

**05041009 Форум**

**Заявник:** Приватне підприємство "Агросвіт"

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок середньої довжини. Цибулина середня за розміром, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, золотистого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 80,0 т/га, маса товарної цибулини 85-135 г, вегетаційний період 120 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 11,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 7,5.

**05041025 Червоний Глобус**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт відсутній. Листок середньої довжини. Цибулина великого розміру, висока, широкооберненояцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, червоного кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 68,0-81,0 т/га, маса товарної цибулини 98-120 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 8,2.

**05041040 Штутті**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Свитязь"

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт сильний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, низька, поперечноеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Мала кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.