

Вид: Інду посівний *Eruca sativa* Mill.

Заявка № 20500001 **Назва сорту:** Барвінковий **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата пріоритету: 14.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.08.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210597

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Молода рослина: положення листків	напівпохиле	3	
3	Молода рослина: щільність розетки	помірно щільна	5	
4	Молода рослина: за висотою	середня	5	
5	Листок: форма	ліроподібно-перисторозсічений	2	
6	Тільки для сортів з розсіченими на частки листками. Листок: кількість часток	багато	7	
7	Листок: за товщиною пластинки	середній	5	
8	Листок: за довжиною	середній	5	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Листок: черешок за товщиною	середній	5	
12	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Стебло: положення	похиле	2	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
15	Тільки для сортів із наявним антоціановим забарвленням. Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
16	Стебло: гілкування (кількість гілок 1-го порядку)	помірне	5	
17	Стебло: інтенсивність опушення	помірне	5	
18	Стебло: за товщиною (на рівні ґрунту)	середнє	5	
19	Квітка: забарвлення на початку цвітіння	білувате	1	
20	Квітка: щільність фіолетового жилкування пелюсток	помірне	5	
21	Стручок: дзьобик за довжиною	середній	5	
22	Стручок: за довжиною (від плодоніжки до основи дзьобика)	середній	5	
23	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрямок використання: 1 – зелені листки. Товарна врожайність, т/га – 17,1. Період від сходів до збирання врожаю, днів – 29. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 101,9; йоду, мг/100 г – 7; заліза, мг/100 г – 0,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Erysiphe cichoracearum* DC.) – 9; плямистість темно-оливкова (*Alternaria* ssp.) – 9; церкоспороз (*Cercospora* ssp.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.