

**КУЛИКОВСЬКИЙ F1.** Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН.

Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, консервного призначення. Вегетаційний період - 81 день. Рослини середньо-рослі (220 см). Качани циліндричні, довжина - 19 см, маса - 185-220 г., число рядів зерна - 12-14. Зерно коротке, широке, янтарно-жовте. Дегустаційна оцінка - 8,5 бала. Вміст сухої речовини - 25,2%, цукру - 2,3-4,6%. Урожайність - 81-85 ц/га.

**РОСТАВИЦЯ F1.** Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, консервного призначення. Вегетаційний період - 84 дні. Рослини середньо-рослі (189-213 см). Качани циліндричні, довжина - 18,4 см, маса - 182-196 г., число рядів зерна - 12. Зерно широке, коротке, янтарно-жовте. Дегустаційна оцінка - 8,2-9,0 бала. Вміст сухої речовини - 35,0%, крохмалю - 23,0%, цукру - 1,6-4,8%, клітковини - 1,3%. Сорт стійкий до ураження сажкою. Урожайність - 98,4 ц/га.

**СКВИРКА (РОКСОЛАНА) F1.** Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН.

Рекомендований для вирощування в усіх зонах, ранньостиглий, консервного призначення. Вегетаційний період - 76 днів. Рослини середньо-рослі (168-211 см). Качани циліндричні, довжина - 17,3 см, маса - 196-200 г, число рядів зерна - 12. Зерно широке, коротке, жовто-оранжеве. Дегустаційна оцінка - 8,1-8,8 бала. Вміст сухої речовини - 21,3%, цукру - 4,4-5,9%. Урожайність - 82,0 ц/га.

## САЛАТ

**ГРЕНАДА.** Заявник фірма ПНОС (Польща). Ранньостиглий, призначений для вирощування у відкритому ґрунті навесні й восени. Від масових сходів до утворення головки, залежно від зони вирощування, проходить 55 - 75 днів. Формує великі головки, маса яких часто перевищує 1,5 кг. За формою головки круглі, щільні. Листки сіро-зеленого кольору, ніжні, високих смакових якостей. Сорт з тривалим періодом господарського використання, стійкий до утворення квітконосних пагонів.

**КУЧЕРЯВЕЦЬ ОДЕСЬКИЙ.** Заявник Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція. Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу України, середньостиглий, призначений для споживання у свіжому вигляді. Вегетаційний період - 68-75 днів. Розетка середня або велика, діаметром 24-32 см, напівприпіднята. Листки світло-зелені, віялоподібні, поверхня їх пористо-здута і пористо-вдавлена. Консистенція хрустяча, грубувата. Головка рихла, середньої величини, висота - 9-11, ширина - 9-10 см. Маса однієї рослини 260-315 г. Слабо пошкоджується гнилями та в середньому ступені - пероноспорозом і септоріозом. Урожайність - 104-271 ц/га.

**СОВСЬКИЙ.** Заявник Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка Національної академії наук України. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, призначений для споживання у свіжому вигляді. Вегетаційний період - 53 дні. Розетка при складанні в головку вертикальна, діаметр - 16 см, висота - 20 см. Листки видовжено-обернено-яйцеподібної форми, середнього розміру, краї



злегка хвилясті, фіолетово-вишневого забарвлення. Головка видовжено-овальної форми, висота до 35 см, рихла, світло-зеленого кольору з антоціановим відтінком, маса - 257-400 г. Вміст сухої речовини - 6,5%, білку - 1,2%, аскорбінової кислоти - 9,3 мг%. Сорт стійкий до ураження хворобами, відносно стійкий до стрілкування, транспортабельний. Урожайність - 455 ц/га.

### КРЕС - САЛАТ

**ВІСТЬ.** Заявник Інститут овочівництва та баштництва УААН. Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Полісся України, ранньостиглий, призначений для використання у свіжому вигляді. Вегетаційний період - 20-30 днів. Розетка напівприпіднята, діаметр - 49-65, висота - 37 см. Стебло середнє, зелене. На одній рослині формується 23-105 листків. Листки трьохперисторозсічені з глибоко надрізнаними краями, нижні - короткочерешкові. Дегустаційна оцінка - 8,0 бала. Урожайність - 1 кг/м<sup>2</sup>.

### ГІРЧИЦЯ - САЛАТНА

**ВОЛНУШКА.** Внесений до Реєстру сортів рослин України в 1988 році. Рекомендований для вирощування в Степу, ранньостиглий. Вегетаційний період - 20 днів. Розетка велика, прямостояча, злегка розлога з 4-6 листками. Листки овально-видовжені, розсічені в нижній частині, без опушення. Листкова пластинка світло-зелена, із зеленуватим відтінком, без воскового нальоту. Краї листка хвилясті, зазублені, поверхня зморшкувата, без антоціанового забарвлення. Смакові якості - відмінні. Стійкий до основних хвороб. Урожайність - 90 ц/га.

**ЧЕРВОНОЛИСТА.** Внесений до Реєстру сортів рослин України в 1988 році. Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Полісся України, ранньостиглий. Вегетаційний період - 28-40 днів. Розетка велика (26-37 см), прямостояча, з 10-15 листками. Листки великі, округлі, зверху ширші з поступовим звуженням до основи. Листкова пластинка темно-зелена, з червоно-фіолетовим відтінком, восковий наліт незначний. Поверхня тканини листка щільна, жорстка. Краї листків злегка зазублені, хвилясті. Нижні листки короткочерешкові. Смакові якості - добрі. Урожайність - 250 ц/га.

### ХРІН

**ВАЛКІВСЬКИЙ.** Внесений до Реєстру сортів рослин України в 1977 році. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, ранньостиглий. Вегетаційний період - 182-192 дні. Розетка листків напівприпіднята. Листки темно-зелені, еліпсоподібні, зовнішні цілокраї, в центрі розетки розсічені з гладенькою або слабкопухирчатою поверхнею. Черешки - 15-20 см. Корінь циліндричний, жовтуватий, в перший рік життя слабкорозгалуджений. М'якоть біла, ароматна, волокниста, відносно соковита, гостра на смак. Довжина кореня - 50-60 см, товщина - 2-3 см, середня маса до 150 г. Сорт стійкий до пошкодження сухою фузаріозною гниллю та чорною плісінню. Урожайність - 100-182 ц/га.