

Вид: Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

Заявка № 20094003 Назва сорту: Еллісон Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата пріоритету: 21.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.02.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220261

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	темно-зелене	3	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	ранній	3	до середнього
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	середній	5	
5	Листочок: за шириною	широкий	7	
6	Листочок: місце максимальної ширини	ближче до основи	3	
7	Квітка: за довжиною	коротка	3	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	мале	3	
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	висока	7	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	мала	3	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	довгий	7	
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	середній	5	
17	Суша насінина: форма поздовжнього розрізу	неправильної форми	3	
18	Суша насінина: маса 100 насінин	середня	5	
19	Суша насінина: забарвлення насінневої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суша насінина: чорна пігментація рубчика	відсутня	1	

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Урожайність насіння, т/га – 4,3; зеленої маси, т/га – 15,0. Вміст білка в зеленій масі, % – 27. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.), бал (1–9) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 7; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 7; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 7. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.), бал (1–9) – 7; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 7; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 7.

##### Географічні та зонові рекомендації використання сорту: