

**Вид:** Костриця тонколиста *Festuca filiformis* Pourr.**Заявка № 20484001 Назва сорту:** Аврелія **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669**Дата пріоритету:** 16.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.04.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 220333**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Піхва листка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: за природною висотою	середня	5	
4	Рослина: габітус	проміжний	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Лише для сортів костриці червоної: Листок: за шириною	ознака не визначалася	0	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1	
9	Рослина: формування кореневища	середнє	2	
10	Рослина: час появи волоті	середній	5	
11	Рослина: за природною висотою під час появи волоті (прапорцевий листок не враховують)	середня	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначалася	0	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина	ознака не визначалася	0	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною, включаючи волоть	середнє	5	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	довге	7	
17	Волоть: за довжиною	середня	5	
18	Волоть: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або слабка	1	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 109. Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,8. Збір сухої речовини, т/га – 7,85. Маса 1000 насінин, г – 1,2. Стійкість до вилягання, балів – 7. Стійкість до осипання, балів – 8. Зимостійкість, балів – 8. Посухостійкість, балів – 7. Вміст в абсолютно сухій речовині, %: сирого протеїну – 12,8; сирій клітковини – 27,8. Кількість укусів, шт. – 5. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, днів – 74. Тривалість періоду від весняного відростання до укїсної стиглості, днів – 36. Продуктивне довголіття, років – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сажка – 8; борошнеста роса – 8; снігова пліснява – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.