

Вид: Горошок волохатий *Vicia villosa* Roth

Заявка № 21091001 Назва сорту: Белла **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент № 220482**

Дата пріоритету: 29.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220417

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	розлогий	2	
2	Рослина: за довжиною	довга	7	
3	Сіянець: антоціанове забарвлення біля основи	наявне	9	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Стебло: місце галуження	біля основи	1	
6	Стебло: інтенсивність опушення	сильна	7	
7	Листок: кількість листочків	середня	5	
8	Листочок: за формою	лінійний	1	
9	Листочок: за шириною	широкий	7	
10	Листочок: за розміром	середній	5	
11	Листочок: інтенсивність опушення нижнього боку	слабка	3	
12	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
13	Квітка: за довжиною	ознака не визначалась	0	
14	Квітка: інтенсивність білоділового забарвлення	помірна	5	
15	Рослина: тип розвитку	однорічний	1	
16	Біб: форма	видовженоромбічна	1	
17	Біб: за довжиною	короткий	3	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: забарвлення	темно-коричневе	2	
20	Насінина: орнаментация	наявна	9	
21	Насінина: діаметр	середній	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,2; зеленої маси/сухої речовини – 5,5. Вміст в зеленій масі (за стандартної вологості 80%), %: білка – 19,5; клітковини – 25,4. Залистяність, % – 52. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *viciae* Jacz) – 8; іржа (*Uromyces fabae* de Bary f. *viciae-sativae*) – 8; чорна плямистість (*Placosphaeria onobrychidis* Sacc) – 7; аскохітоз (*Ascochyta punctata* Naumov) – 7; антракноз (*Colletotrichum villosum* Weimer) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.