

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045014 Назва сорту: Рината **Заявник (код):** 1807 **Власник сорту (код):** 1807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.12.2022 **Патент №** 220955

Дата пріоритету: 05.10.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220816

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,26	3,02	2,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,49	-0,04	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %	27,7	-1,3	-2,0
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	104	115	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	176,5	218,6	190,9
Висота рослини, см	66,2	92,7	91,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,7	12,5	15,9
Стійкість до вилягання, бал	8	5	5
Стійкість до обсіпання, бал	6	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39	40,4	36,6
Вміст олії, %	22,7	21,4	22,7
Блок (група стиглості)	6	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.