

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045023 Назва сорту: Рівerton **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220978

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,76	3,28	3,00
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,90	0,17	0,12
+, - до усередненої урожайності, %	48,4	5,5	3,9
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	130	136
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	186	227,3	189,4
Висота рослини, см	69	93	99,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,8	13,7	16,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38	41	37,2
Вміст олії, %	23,3	20,6	21,3
Блок (Група стиглості)	7	7	8
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.