

**Вид:** Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.

**Заявка № 21201001 Назва сорту:** Маркіз **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.11.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220709**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Листок: положення у просторі	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: кількість	середня	5	
4	Листя: діаметр коренеплоду в місці прикріплення черешків	середній	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішніх листків	помірна	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
7	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	середня	5	
10	Черешок: за довжиною	середній	5	
11	Черешок: за шириною	вузький	3	
12	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
13	Листкова пластинка: розмір верхівкового листочка	середній	5	
14	Листочок: форма краю верхівки	проміжна	2	
15	Листочок: щільність надрізів краю	помірна	5	
16	Листочок: розміщення часток	дотичне	2	
17	Коренеплід: розмір	великий	7	
18	Коренеплід: виступ на поверхні	слабкий	3	
19	Коренеплід: основне забарвлення шкірки	білувате	1	
20	Лише для сортів, коренеплоди яких коричневого забарвлення. Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
21	Коренеплід: місце розміщення коренів	середнє	5	
22	Коренеплід: кількість коренів	мала	3	
23	Коренеплід: корені за товщиною	тонкі	3	
24	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	1	
25	Коренеплід: забарвлення м'якоті	біле	1	
26	Коренеплід: внутрішнє заглиблення	мале	3	
27	Коренеплід: губчатопоподібність м'якоті	слабка	3	
28	Коренеплід: внутрішня іржаста плямистість м'якоті	помірна	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Збір сухої речовини в середньому за рік використання, т/га – 65,0. Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 250. Середня маса коренеплоду, г – 650,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Вміст клітковини, % – 3. Лежкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe umbelliferarum* DB.) – 8; септоріоз (*Septoria apii* Chest.) – 8; суха гниль (*Phoma apiicola* Kleb.) – 8; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.