

**Вид:** Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.

**Заявка № 18201001 Назва сорту:** Мерга **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.04.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190830**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Листок: положення у просторі	пряме	1	
3	Листки: кількість	середня	5	
4	Листя: діаметр коренеплоду в місці прикріплення черешків	ознака не визначалась	0	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішніх листків	помірна	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
7	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	середня	5	
10	Черешок: за довжиною	середній	5	
11	Черешок: за шириною	середній	5	
12	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
13	Листкова пластинка: розмір верхівкового листочка	малий	3	
14	Листочок: форма краю верхівки	гостра	1	
15	Листочок: щільність надрізів краю	помірна	5	
16	Листочок: розміщення часток	перекривне	3	
17	Коренеплід: розмір	середній	5	
18	Коренеплід: виступ на поверхні	слабкий	3	
19	Коренеплід: основне забарвлення шкірки	білувате	1	
20	Лише для сортів, коренеплоди яких коричневого забарвлення. Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
21	Коренеплід: місце розміщення коренів	низьке	3	
22	Коренеплід: кількість коренів	середня	5	
23	Коренеплід: корені за товщиною	середні	5	
24	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	округла	2	
25	Коренеплід: забарвлення м'якоті	біле	1	
26	Коренеплід: внутрішнє заглиблення	середнє	5	
27	Коренеплід: губчастоподібність м'якоті	ознака не визначалась	0	
28	Коренеплід: внутрішня іржаста плямистість м'якоті	помірна	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Збір сухої речовини в середньому за рік використання, т/га – 2. Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 155. Середня маса коренеплоду, г – 800. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Вміст клітковини, % – 1,4. Лежкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe umbelliferarum* DB.) – 5, септоріоз (*Septoria apii* Chest.) – 4, суха гниль (*Phoma apiicola* Kleb.), біла гниль (*Sclerotinia libertiana* Fuck.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.