

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 15101007 Назва сорту: Вердоне **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2018 **Патент №** 180086

Дата пріоритету: 02.11.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170804

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	сильна	7
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	висока	7
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	трикутна	5
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	ознака не визначається	0
21	Головка: забарвлення	зелене	4
22	Головка: горбкуватість	дуже сильна	9
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	жовте	2
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від пізньої до дуже пізньої	8
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5
28	Чоловіча стерильність	повна	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 65 т/га, товарна врожайність – 59 т/га, період від повних сходів до початку досягання – 80 діб, період плодоношення – 14 діб, вміст білка – 2,1 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.