

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 14196001 Назва сорту: НУТPI **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171329

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	низька	3
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	низька	3
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	низька	3
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	50,2	91,1	99,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	7,3	7,8	7,8
Урожайність, сухої речовини, ц/га	37,8	105,7	122,4
+,- до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-12,3	14,6	23,3
+,- до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-25	16	24
Тривалість періоду вегетації, днів	55	86	76
Стійкість до вилягання, бал	8,7	9,0	8,8
Стійкість до посухи, бал	8,0	8,3	8,2
Стійкість проти стеблової іржі, бал	8,3	9,0	7,8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9,0	9,0	8,7
Зимостійкість, бал	8,3	8,7	7,2
Залистяність, %	50,1	45,7	49,5
Вміст сирого протеїну, %	19,9	19,1	19,2
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.