

Вид: Лілійник гібридний *Heimerocallis hybrida hort.*

Заявка № 14498014 Назва сорту: Світанок **Заявник (код):** 317 **Власник сорту (код):** 317

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.03.2018

Патент № 180367

Дата пріоритету: 23.07.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	міцно спляча	1
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: габітус	розлогий	2
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Квітконос: залістяність	наявна	9
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	1
13	Суцвіття: приквіткі	наявні	9
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час цвітіння	середній	4
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	мала	3
21	Квітка: діаметр	малий	3
22	Квітка: за типом	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	зіркоподібна	3
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожеве	3
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвіттини	однокольорова	1
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	червоно-рожеве	17
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	червоно-рожеве	17
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	червоно-рожеве	17
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	червоно-рожеве	17
30	Квітка: візерунок	вічко	2
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвіттини	жовто-зелене	5
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0
35	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
36	Квітка: аромат	відсутній	1
37	Оцвітнина: відносно розташування часток	напівдотичне	2
38	Оцвітнина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	горизонтальні	2
39	Оцвітнина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	підняті догори	1
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	тупа	4
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	гофрований	3
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівний	1
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	рівна	1
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1
46	Квітка: трубка оцвіттини за довжиною	довга	2
47	Квітка: за довжиною тичинки	середня	5
48	Тичинка: основне забарвлення	жовто-зелене	5
49	Тичинка: забарвлення пиляків	коричневе	3
50	Пилок: забарвлення	помаранчеве	3
51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	низький	3
53	Стовпчик: основне забарвлення	жовто-зелене	5
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	на рівні	5
55	Приймочка: забарвлення	жовто-зелене	5
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини становить 70 см. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння – 85 діб. Тривалість цвітіння суцвіття – 25 діб. Тривалість цвітіння рослини – 40 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність – 89 балів. Коефіцієнт вегетативного розмноження – 40%. Зимостійкість та посухостійкість – 7 балів. Стійкість проти пошкодження комариком лілійника – 8 балів, павутинним кліщем – 7 балів. Стійкість проти ураження гнилями кореневої шийки – 7 балів та хлорозом – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.