

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 15127004 Назва сорту: Капріка **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171313

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|---------------------------------|-----|
| 1 | Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотила | відсутнє | 1 |
| 2 | Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: тип росту | кущовий | 1 |
| 4 | Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка | ознака не визначається | 0 |
| 5 | Лише кущові сорти. Рослина: тип | несланкий | 1 |
| 6 | Лише кущові сорти. Рослина: за висотою | низька | 3 |
| 7 | Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80 % рослин) | ознака не визначається | 0 |
| 8 | Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання | ознака не визначається | 0 |
| 9 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 |
| 10 | Листок: зморшкватість | помірна | 5 |
| 11 | Верхівковий листочок: розмір | середній | 5 |
| 12 | Верхівковий листочок: форма | від округлої до ромбічної | 4 |
| 13 | Верхівковий листочок: верхівка за довжиною | довга | 3 |
| 14 | Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння) | проміжне | 2 |
| 15 | Квітка: розмір приквітків | великий | 7 |
| 16 | Квітка: забарвлення паруса | біле | 1 |
| 17 | Квітка: забарвлення крил | біле | 1 |
| 18 | Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика) | середній | 5 |
| 19 | Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18) | ознака не визначається | 0 |
| 20 | Біб: за шириною | середній | 5 |
| 21 | Біб: за товщиною | помірний | 5 |
| 22 | Біб: форма поперечного перерізу (через насінину) | округла | 4 |
| 23 | Біб: відношення товщини до ширини | середнє | 5 |
| 24 | Біб: основне забарвлення | зелене | 2 |
| 25 | Біб: інтенсивність основного забарвлення | помірна | 5 |
| 26 | Біб: вторинне забарвлення | відсутнє | 1 |
| 27 | Біб: вторинне забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 28 | Біб: щільність плям вторинного забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 29 | Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва | відсутня | 1 |
| 30 | Біб: ступінь вигину | слабкий | 3 |
| 31 | Біб: форма вигину | увігнута | 1 |
| 32 | Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика) | від загостреної до заокругленої | 2 |
| 33 | Біб: дзьобик за довжиною | довгий | 7 |
| 34 | Біб: вигин дзьобика | слабкий | 3 |
| 35 | Біб: текстура поверхні | помірно шерехата | 5 |
| 36 | Біб: звуження (у сухому стані) | помірне | 2 |
| 37 | Насіння: маса | середня | 5 |
| 38 | Насінина: форма поздовжнього розрізу | ниркоподібна | 4 |
| 39 | Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину | слабкий | 3 |
| 40 | Насінина: форма поперечного перерізу | округла | 5 |
| 41 | Насінина: за шириною в поперечному перерізі | вузька | 3 |
| 42 | Насінина: за довжиною | середня | 5 |
| 43 | Насінина: кількість кольорів | один | 1 |
| 44 | Насінина: основне забарвлення (найбільша зона) | біле | 1 |
| 45 | Насінина: вторинне забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 46 | Насінина: розподіл вторинного забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 47 | Насінина: вираження орнаменту | помірне | 5 |
| 48 | Час цвітіння (50 % рослин мають щонайменше одну квітку) | середній | 5 |
| 49,1 | Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Паса б | ознака не визначалась | 0 |
| 49,2 | Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Паса Кappa | ознака не визначалась | 0 |
| 50 | Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV) | ознака не визначалась | 0 |
| 51 | Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>) | ознака не визначалась | 0 |
| 52 | Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>) | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота прикріплення нижнього бобу – 19 см, висота рослин – 65 см. Маса 1000 насінин – 310 г.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.