

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 16421003 Назва сорту:** Аруша **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.12.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171403**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	дуже сильне	9
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначалась	0
13	Головка: форма позаднього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату)	напівпряме	3
16	Листок: форма	округла	4
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глясватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабе	1
34	Час збиральної стиглості	пізній	7
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	ознака не визначалась	0
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 24. Середня маса головки, г – 590. Щільність головки, бал (1–9) – 6. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, дів – 63. Група стиглості: середня – 5. Вміст у головках: сухої речовини, % – 4,7. Вміст у головках: цукрів, % – 1,9. Вміст у головках: вітаміну С, мг% – 2,8. Холодостійкість, бал (1–9) – 6. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhauz) – 8, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 7, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 8, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 7. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.