

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch

Заявка № 12079002 Назва сорту: Дар Степу Заявник (код): 1850 Власник сорту (код): 1850

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.10.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171340

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: розмір	великий	7
2	Дерево: за силою росту	середнє	5
3	Дерево: габітус	розлогий	3
4	Квітконосний пагін: за товщиною	товстий	7
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	довгі	7
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5
9	Квітка: тип	розетковий	2
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4
11	Пелюстка: форма	вузькоеліптична	3
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	нижче	1
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	вище	3
17	Пиляки: пилок	наявний	9
18	Зав'язь: опушення	наявне	9
19	Прилистки: за довжиною	середні	5
20	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
22	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	велике	7
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1
24	Листкова пластинка: форма краю	ознака не визначена	0
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1
26	Листкова пластинка: кут верхівки	середній	5
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	ознака не визначена	0
29	Черешок: за довжиною	довгий	7
30	Черешок: нектарники	наявні	9
31	Черешок: форма нектарників	округла	1
32	Плід: розмір	великий	7
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	дуже вдавнена	5
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1
37	Плід: помітність шва	помірна	5
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3
40	Плід: основне забарвлення шкірки	кремово-біле	5
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	темно-червоний	6
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	смугами	3
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9
45	Плід: щільність опушення шкірки	помірне	5
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0
48	Плід: шкірка за товщиною	тонка	3
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	дуже слабке	1
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	7
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	відсутнє або слабке	1
55	Плід: волокнистість м'якоті	помірна	2
56	Плід: цукристість	висока	7
57	Плід: кислотність	низька	2
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	оберненояцеподібна	4
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	ознака не визначена	0
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5
62	Кісточка: рельєфність поверхні	лише борідки	5
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	слабкий	3
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	ознака не визначена	0

№	Ознака	Проявлення	Код
67	Час початку цвітіння	середній	5
68	Час споживчої стиглості	середній	5

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність – 10,5 т/га, середній урожай з дерева – 21,0 кг, середня маса плоду – 197 г, максимальна – 215 г. Вмісту плодах вітаміну С – 6,60 мг%, загального цукру – 10,65 %, сухої речовини – 13,93 %, загальна кислотність – 0,42 %. Стійкість до клястероспороозу – 8 балів. Посухостійкість – 9 балів. Група стиглості – середня, напрям використання – універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,6 балів, транспортабельність – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.