

**Вид:** Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

**Заявка № 16121002 Назва сорту:** Кейтел **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.08.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171258**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: діаметр	великий	7
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	ознака не визначалась	0
5	Листок: вигин верхньої частини	ознака не визначалась	0
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною	середній	5
8	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною	ознака не визначається	0
9	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма	широкооберненояцеподібна	5
10	Листок: забарвлення	зелене	6
11	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною	ознака не визначалась	0
12	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування	ознака не визначалась	0
13	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною	ознака не визначається	0
14	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю	помірна	2
15	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною	ознака не визначалась	0
16	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю	помірна	5
17	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість	сильна	7
18	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	ознака не визначається	0
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	середня	5
20	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи	ознака не визначається	0
21	Стебло: за висотою	середнє	5
22	Стебло: фасціація	нявна	9
23	Стебло: положення бічних пагонів	напівпряме	3
24	Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків	широкоеліптична	2
25	Квітка: забарвлення	блакитне	4
26	Час споживої стиглості	середній	5
27	Час стрілкування	дуже пізній	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 22 т/га. Період від сходів до збирання врожаю – 45 діб. Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз – 7; церкоспороз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.