

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 16040015 Назва сорту: Анністон **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180959

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|------------------------|-----|----------|
| 1 | Насіння: ерукова кислота | відсутня | 1 | |
| 2 | Сім'ядолі: за довжиною | середні | 5 | |
| 3 | Сім'ядолі: за шириною | середні | 5 | |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 5 | Листок: частки | наявні | 9 | |
| 6 | Листок: кількість часток (повний розвиток листка) | велика | 7 | |
| 7 | Листок: зубчастість краю | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: за довжиною (пластинка і черешок) | середній | 5 | |
| 9 | Листок: за шириною (у найширшому місці) | вузький | 3 | |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середня | 5 | |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння | середній | 5 | |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток | жовте | 3 | |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною | довгі | 7 | |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною | середні | 5 | |
| 15 | Рослина: утворення пилку | наявне | 9 | |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння) | висока | 7 | |
| 17 | Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами) | дуже довга | 9 | |
| 18 | Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком) | довгий | 7 | |
| 19 | Стручок: носик за довжиною | середній | 5 | |
| 20 | Стручок: плодоніжка за довжиною | коротка | 3 | |
| 21 | Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби | помірна | 5 | |
| 22 | Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби | ознака не визначається | 0 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 19,7 | 32,1 | 24,1 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| Урожайність, ц/га | 28,2 | 40,1 | 30,9 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га | 8,5 | 8,0 | 6,8 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, % | 43,0 | 25,0 | 28,0 |
| Висота рослин, см | 121 | 114 | 127 |
| Тривалість вегетаційного періоду, днів | 287 | 319 | 298 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 8 | 9 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 8 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 8 | 8 | 8 |
| Зимостійкість, бал | 7 | 7 | 8 |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал | 8 | 7 | 6 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти переноспорозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Вміст білка, % | 19,4 | 19,7 | 17,7 |
| Вміст олії, % | 46,8 | 47,0 | 48,6 |
| Вміст глюкозинолатів, % | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
| Вміст ерукової кислоти, % | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Напрямок використання | олн | олн | олн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.