

**Вид:** Печериця двоспорова *Agaricus bisporus* (J. Lge) Imbach  
**Заявка №** 16448011 **Назва сорту:** Євроміцель E55 **Заявник (код):** 2224 **Власник сорту (код):** 2224  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №  
**Дата пріоритету:**  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017  
**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170569

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Ніжка: за довжиною	середня	5
2	Ніжка: діаметр	середній	5
3	Ніжка: співвідношення довжина / діаметр	середнє	5
4	Ніжка: форма поздовжнього розрізу	прямокутна	2
5	Ніжка: відстань від основи до залишка покривного кільця	середня	5
6	Шапинка: за висотою	середня	5
7	Шапинка: діаметр	великий	7
8	Шапинка: співвідношення висота / діаметр	середнє	5
9	Шапинка: форма поздовжнього розрізу	округла	2
10	Шапинка: за товщиною у поздовжньому розрізі	середня	5
11	Шапинка: утворення лусочок	помірне	5
12	Шапинка: забарвлення	коричневе	4
13	Шапинка: зміна забарвлення маси після розтирання	помірна	5
14	Гіментальні пластинки: забарвлення під час зняття покривала	темно-коричневе	3
15	Базидіоспори: середня кількість утворення спор	чотири	4
16	Відкрита шапинка: діаметр	середній	5
17	Відкрита шапинка: за товщиною	середня	5
18	Відкрита шапинка: розкриття країв	сильне	3
19	Відкрита шапинка: форма центральної частини верхньої сторони	заокруглена	1
20	Час першого дня збирання врожаю	середній	5
21	Час піку першої хвилі плодоношення	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність плодівих тіл – 27 кг/100 кг субстрату, тривалість циклу розвитку міцелію до плодоношення – 39 діб, тривалість періоду плодоношення – 15 діб, тривалість періоду зберігання при температурі +2...+4 – велика (понад 6 діб), діаметр шапинки – 5,5 см, довжина ніжки – 8 см, щільність консистенції плодівих тіл – середня, вміст сухої речовини – 7 %. Сорт придатний до переробки: соління, маринування, сушіння. Стійкість до хвороб: мокра гниль – 8 балів, суха гниль – 8 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.