

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.

Заявка № 11009001 Назва сорту: Корсар Заявник (код): 1715 Власник сорту (код): 1715

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету: 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160890

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	слабка	3
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутні	1
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
11	Листок: форма язичка	подвійний	3
12	Листок: колір язичка	безбарвний	1
13	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	горизонтальне	5
17	Стебло: габітус	прямий	1
18	Тільки для плавального рису. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначена	0
19	Час виявлення волоті (50% рослин з волотями)	ранній	3
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабе	1
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	слабе	3
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	дуже сильне	7
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
25	Стебло: за товщиною	середнє	5
26	Стебло: за довжиною (включно волоті; плавальний рис у тому числі)	середнє	5
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначена	0
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
30	Волоть: довжина головної осі	середня	5
31	Волоть: кількість на рослині	середня кількість	5
32	Волоть: остюки	відсутні	1
33	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначена	0
34	Волоть: розташування остюків	ознака не визначена	0
35	Волоть: довжина найдовших остюків	ознака не визначена	0
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	слабе	3
37	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	коричневий	3
38	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
39	Волоть: вигин головної осі	напівпряма	2
40	Волоть: наявність вторинного гілкування	відсутнє	1
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначена	0
42	Волоть: положення гілок	пряме	1
43	Волоть: характер виявлення	добре виявляється	9
44	Час досягання	ранній	3
45	Листок: пожовтіння (старіння)	середнє	5
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	від червонуватого до світло-пурпурного	4
47	Нижня колоскова луска: орнаментация	пурпурові плями	4
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабе	1
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабе	1
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабе	1
51	Колоскова луска: за довжиною	середня	5
52	Колоскова луска: забарвлення	дуже коротка	1
53	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	велика	7
54	Зернівка: за довжиною	середня	5
55	Зернівка: за шириною	середня	5
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначена	0
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначена	0
58	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
59	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
61	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
62	Ендосперм: тип	ознака не визначається	0
63	Ендосперм: за присутністю амілази	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	ознака не визначена	0
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	65,4	-	-
± до усередненої урожайності, ц/га	8,8	-	-
± до усередненої урожайності, %	16	-	-
Вегетаційний період, діб	110	-	-
Висота рослин, см	81	-	-
Маса 1000 насінин, г	31	-	-
Стійкість до вилягання, бал	8,3	-	-
Стійкість до осипання, бал	9,0	-	-
Стійкість до пірикуляріозу, бал	9,0	-	-
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	-	-
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	9,0	-	-
Стійкість до корневих гнилей, бал	9,0	-	-
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	-	-
Вимолочуваність, бал	7,7	-	-
Плівчастість, %	18,1	-	-
Склоподібність, %	90,0	-	-
Вміст білка, %	9,5	-	-
Напрямок використання	х	-	-

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.