

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 15096003 Назва сорту: Пушма **Заявник (код):** 1730

Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.04.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160840

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	низька	3
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	рівна	2
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f sp. <i>Conglutinans</i>	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 60 т/га, період від сівби до початку досягання – 90 діб, стійкість до бактеріозу слизового – 8 балів, стійкість до бактеріозу судинного – 7 балів, вміст сухої речовини – 8,9%, вміст загального цукру – 5,2%, вміст вітаміну С – 45,6 мг%, лежкість – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.