

Вид: Лілійник *Heimerocallis* L.

Заявка № 14326002 Назва сорту: Шико Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.05.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160871

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	тетраплоїд	4
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: габітус	компактний	1
6	Листок: положення у просторі	поникле з середини	3
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	високо піднятий над листками	3
11	Квітконос: залістяність	відсутня	1
12	Суцвіття: за щільністю	щільне	9
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час цвітіння	середній	4
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	велика	7
19	Квітка: кількість на рослині	велика	7
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	велика	7
21	Квітка: діаметр	середній	5
22	Квітка: за типом	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	трикутна	2
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожеве	3
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	світле червоно-рожеве	16
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	світле червоно-рожеве	16
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	світле червоно-рожеве	16
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	світле червоно-рожеве	16
30	Квітка: візерунок	вічко	2
31	Квітка: основне забарвлення рисунка на частках оцвітини	пурпурове	27
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0
35	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
36	Квітка: аромат	відсутній	1
37	Оцвітина: відносно розташування часток	напівводичне	2
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті	3
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	загострена	1
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	гофрований	3
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвилястий	2
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	зморшкувата	2
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	довга	2
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7
48	Тичинка: основне забарвлення	світле жовто-оранжеве	12
49	Тичинка: забарвлення пиляків	рожево-коричневе	2
50	Пилок: забарвлення	помаранчеве	3
51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5
53	Стовпчик: основне забарвлення	світле жовто-оранжеве	12
54	Квітка: положення прийомки відносно пиляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	світле жовто-оранжеве	12
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	мала	3

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин – 70 см. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння – 70 діб, тривалість цвітіння суцвіття – 20 діб, тривалість цвітіння рослини – 47 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Зимостійкість та посухостійкість – 9 балів. Стійкість проти хвороб та шкідників – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.