

Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 13113007 Назва сорту Фіджи

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.07.2015 Патент №: 150753

Дата пріоритет 19.07.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

09.06.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150912

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже слабке	1
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно опукла	7
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	жовтувате	2
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	прямокутна	5
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	середня	5
38	Плід: форма верхівки	притиснута	4
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	відсутня	1
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1

49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytophthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 30 кг/м², середня маса плоду 100 г, вміст сухої речовини 8,6%, тривалість періоду до досягання 127 діб, товщина стінки плоду 6 мм, вміст загального цукру 3,5%, вміст вітаміну С 170 мг%, вміст клітковини 1,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт.