

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 12034012 Назва сорту АППЕРКАТ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.09.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151016

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	прямий	1
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	дуже довгий	9
8	Коренеплід: за шириною	вузький	3
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	дуже велике	9
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже малий	1
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	помірно виражені	5
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	малий	3
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	сильне	7
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	однакова	2
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабке	1
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	середня	5
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	багато	3
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 70 т/га, тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості 135 діб, вміст загального цукру 8%, вміст сухої речовини 12%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ.