

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.**Заявка №** 13136003 **Назва сорту:** Корос**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151074**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------|-----|
| 1 | Рослина: кількість стебел | одне | 1 |
| 2 | Рослина: за висотою (за збирання) | низька | 3 |
| 3 | Листок: за положенням (на початку формування головки) | горизонтальний | 5 |
| 4 | Листок: за довжиною | короткий | 3 |
| 5 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 6 | Листок: кількість часток | середня кількість | 5 |
| 7 | Листкова пластинка: забарвлення | зелене | 1 |
| 8 | Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення | темне | 7 |
| 9 | Листкова пластинка: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість країв | сильна | 7 |
| 11 | Листкова пластинка: зубчастість країв | помірна | 5 |
| 12 | Листкова пластинка: пухирчастість | слабка | 3 |
| 13 | Черешок: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 14 | Черешок: за довжиною | середній | 5 |
| 15 | Головка: довжина галузок від основи (не враховуючи стебло) | короткі | 3 |
| 16 | Головка: за розміром | велика | 7 |
| 17 | Головка: форма у позовжньому розрізі | обернено-еліптична | 3 |
| 18 | Головка: забарвлення | сіро-зелене | 3 |
| 19 | Головка: інтенсивність забарвлення | темне | 7 |
| 20 | Головка: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 21 | Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірне | 5 |
| 22 | Головка: горбкуватість | помірна | 5 |
| 23 | Головка: структура тканини | помірна | 5 |
| 24 | Головка: за щільністю | щільна | 7 |
| 25 | Головка: покривний листок | відсутній | 1 |
| 26 | Рослина: вторинні головки (за збирання) | наявні | 9 |
| 27 | Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26) | сильна | 7 |
| 28 | Квітка: забарвлення | жовте | 2 |
| 29 | Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення | помірне | 5 |
| 30 | Час досягання (50% рослин) | ранній | 3 |
| 31 | Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток) | ранній | 3 |
| 32 | Чоловіча стерильність | наявна | 9 |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарний урожай – 9,5 т/га, тривалість періоду до досягання – 65 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.